

# angchair™ アンチェアー 説明同意書

## 治療説明

人体に安全な強度レベルの収束電磁場を使用したテクノロジーで、意思で動かす随意筋収縮とは対照的に、意思とは関係ない深部の筋肉に、大きく、強力に作用します。治療時間 30 分で最大 5 時間 30 分と同様の運動効果をもたらし、骨盤底筋付近のコアマッスルを鍛える全く新しい医療機関専用の非侵襲性（痛みの無い）リハビリ機器です。

## 治療前の注意（禁忌事項）

- 1) 現在治療中の疾患のある方
  - 2) 悪性腫瘍、肺機能不全、重度の心臓疾患、精神疾患、てんかん、自己免疫疾患、ベル麻痺の方。
  - 3) 感染症、及び感染症の疑いのある方
  - 4) 薬を服用されている方／血液凝固剤を使用されている方
  - 5) ペースメーカーを使用されている方
  - 6) 除細動器を使用されている方
  - 7) 神経刺激器インプラント、電機系インプラントを使用されている方
  - 8) 治療部位に金属系のインプラントやシリコンが挿入されている方
  - 9) 該当部に手術歴や既往症がある方
  - 10) 出血の見られる方
  - 11) アレルギーのある方
  - 12) 妊婦または妊娠している可能性のある方、および授乳中の方（妊婦、授乳婦に対する安全性は確立していません）
  - 13) 注入直後の皮膚充填剤（ヒアルロン酸など）が入っている方
- ※他の痩身治療を受けられている方は事前に申し出てください。
- ※お食事は治療 1 時間前にお済ませください。

## 治療中の注意

- 1) 治療中に振動が生じます。
- 2) 治療中の振動を不快に感じる場合がございます。
- 3) 治療中、治療部位に熱さを感じる場合がございます。無理せずスタッフに伝えてください。我慢されると火傷を引き起こす可能性があります。

#### 治療後の経過と注意/予想される副作用

- 1) 治療の数日後に軽い筋肉痛を感じる場合があります。
- 2) 治療後、治療部位に赤みが見られる場合がございます。
- 3) また、稀に熱傷などの副作用が起こることもございます。
- 4) 筋肉構造改善における最良の結果は、組織の成長、肥厚、再生が完全に完了する、最後の治療から 14 日後に確認されます。
- 5) 治療の効果には個人差があります。
- 6) 治療後は水分をしっかりと摂取してください。
- 7) お食事を召し上がる場合は治療後 1 時間空けてください。
- 8) 医師から治療中止の指示があった場合は、その指示に従ってください。

以上、書面の内容を十分に理解し、疑問点については質問し、説明を受け納得した上で施術を受ける手続きをしたことを認めます。

日付:                      年              月              日

住所:

氏名:

印